

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 7

Coleoptera: Staphylinidae

Tachyporus dispar (Paykull, 1789). Bohemia c., Praha - Troja (5852), 1.vi.1986, 1 ex., 2.i.1991, 2 ex., M. Kocian lgt., M. Schülke det. Bohemia c., Praha - Kobylisy (5852), 9.iv.1986, 1 ex., M. Kocian lgt., det. Bohemia c., Praha - Dubec (5953), 15.x.1990, 1 ex., J. Strejček lgt., M. Kocian det. Bohemia c., Praha - Radlice (5952), 12.x.1988, 1 ex., J. Strejček lgt., M. Schülke det. Bohemia c., Praha, Podbabské skály (Felsen) 20.i.1989, 1 ex. J. Strejček lgt., M. Schülke det. Bohemia c., Praha - Zbraslav (6052), 7.viii.1991, 1 ex., J. Strejček lgt., M. Schülke det. Bohemia occ., Michalovy hory, Mariánské Lázně env., Kosový potok - údolí (Tal) (6142), 3.iv.1988, 1 ex., J. Strejček lgt., M. Kocian det. Bohemia occ., Františkovy Lázně env., Soos - rašeliniště (Hochmoor) (5840), 2.x.1988, 1 ex. J. Strejček lgt., M. Schülke det. Bohemia b., Krušné hory, Tisá - Antonínov (5250), 14.xi.1991, 3 ex., J. Strejček lgt., M. Kocian det. Moravia m., Mikulov env., Sv. Kopeček (7165), 8.xii.1989, 1 ex., J. Strejček lgt., M. Kocian det. Moravia c., Jedovnice (6666), 17.vi.1989, 1 ex., M. Kocian lgt., M. Schülke det. Diese Art wurde von Booth (1988) von der Art *T. chrysomelinus* (Linnaeus, 1758) unterschieden. Nach Lohse (1991) ist die Art in der Mitteleuropa häufig. Neu für die Tschechische Republik.

BOOTH R.G. 1988: *The Entomologist*, 107: 127-133. - LOHSE G.A. 1991: *Entomol. Blätter*, 87: 92-98.